

**TRATAMENTO PREVENTIVO ANTES DO ACASALAMENTO**

<b>MÊS</b>	<b>INDICAÇÃO</b>	<b>MEDICAÇÃO / TRATAMENTO</b>
<b>MARÇO</b>	<b>DESINFETANTE</b>	<b>VIRKON</b> ou <b>KIOL</b> Dosagem: 1/2 pacote para 5 litros de água. Borrife em: gaiolas, poleiros, estrados, paredes, janelas e piso. Não é necessário retirar a comida e os bebedouros. Para iniciar, molhe um pano com a solução e coloque na entrada. Limpe os pés e as mãos com a solução, também.
	<b>MICOPLASMOSE</b>	<b>LINCO-SPECTIN</b> Dosagem: 3 ml por litro de água. Colocar em meio bebedouro de cada gaiola, durante 5 dias
<b>ABRIL</b>	<b>ACARICIDA VERMICIDA</b>	<b>IVOMEK pour-on</b> Usar uma gota de Ivomec PourOn na perna ou nas costas de cada pássaro.
<b>MAIO</b>	<b>MICOPLASMOSE</b>	<b>LINCO-SPECTIN</b> Dosagem: 3 ml por litro de água. Colocar em meio bebedouro de cada gaiola, durante 5 dias
<b>JUNHO</b>	<b>DESPARATISAR</b>	<b>KIL RED e K OTRINE</b> Pulverizar todos os pássaros, gaiolas e pertences, inclusive paredes e piso, com solução de Kil Red na proporção de 20 g por 6 litros de água antes do acasalamento. <b>Retire a Alimentação e os Bebedouros</b>
<b>JUNHO</b>	<b>ACARICIDA VERMICIDA</b>	<b>IVOMEK pour-on</b> Usar uma gota de Ivomec PourOn na perna ou nas costas(nuca) de cada pássaro.
<b>JULHO</b>	<b>VITAMINAS</b>	<b>POTENAY B-12</b> Fornecer Potenay B-12 na água durante 15 dias e descansar 15 dias, repetindo o tratamento até o acasalamento.  Dosagem: 5 gotas no bebedouro de 50 ml diariamente.
<b>AGOSTO</b>	<b>DESINFETANTE</b>	<b>VIRKON</b> ou <b>KIOL</b> Dosagem: 1/2 pacote para 5 litros de água. Borrife em: gaiolas, poleiros, estrados, paredes, janelas e piso. Não é necessário retirar a comida e os bebedouros. Para iniciar, molhe um pano com a solução e coloque na entrada. Limpe os pés e as mãos com a solução, também.