

VITAMINAS

A

Indicações: Nas hipovitaminoses e suas manifestações.

Aves: o sintoma de deficiência da vitamina a é crescimento retardado. Nas reprodutoras ocorre diminuição na produção de ovos.

Modo de Usar: 1g a 3g por Kg de ração.

B1

Indicações: Polineurites e inapetência em caninos e felinos.

Aves: a deficiência de vitamina B1 traz desordens nervosas em aves jovens ou adultas, culminando em uma paralisia característica chamada polineurite.

Modo de Usar: 1g a 3g por Kg de ração.

B2

Indicações: Auxilia nas convalescenças, atraso de crescimento, algias e alterações neuromusculares.

Aves: a deficiência da vitamina **B2** causa baixa eclosão e embriões com dedos torcidos e deformados.

Modo de Usar: 1g por Kg de ração a 2g por 10Kg de ração.

B6

Indicações: Auxilia o crescimento e a reprodução. Melhora o apetite.

Aves: a deficiência da vitamina B6 ocasiona movimentos desordenados, seguidos de convulsões, exaustão e morte.

Modo de Usar: 1g por Kg de ração a 2g por 5Kg de ração.

B12

Indicações: Nas anemias produzidas por hemorragias e atos cirúrgicos. Utilizada no tratamento de doenças provocadas por animias. Revitalizador das forças durante o crescimento, convalescenças e nas perdas de peso e apetite.

Aves: a vitamina **B12** é essencial para as aves jovens e também aves reprodutoras.

Modo de Usar: 1g por Kg de ração a 3g por 10Kg de ração.

C

Indicações: Nas hipovitaminoses provocadas por defeitos da síntese ou absorção desta vitamina. Aumenta as defesas orgânicas nas convalescenças de doenças infecciosas, hemorrágicas e febris.

Aves: utilizada na prevenção e tratamento do estresse, viagens e mudanças de alojamento.

Modo de Usar: 0,5 por Kg de ração a 2g por 10Kg de ração.

D3

Indicações: No tratamento do raquitismo e osteomalácia. Regula a fixação de cálcio e fósforo nas consolidações de fraturas e diastrofia óssea.

Aves: a deficiência da vitamina **D3** ocasionará cascas finas e quebradiças nos ovos ou mesmos paralisação da postura.

Modo de Usar: 1 a 2g por Kg de ração.

E

Indicações: Para restabelecer os níveis de vitamina E. A carência da vitamina **E** pode ocasionar: azoospermia e necropermia nos machos; infertilidade, abortos e esterilidade nas fêmeas.

Aves: a vitamina **E** é indicada para o melhor sucesso das reprodutoras e eficiência na eclosão.

Modo de Usar: 1g por Kg de ração a 2g por 10Kg de ração.

H

Indicações: Dermatite, atraso no crescimento, anorexia.

Aves: a deficiência da biotina (vitamina **H**) ocasiona dermatite. A base dos pés fica áspera, calosa e se arrebetam, formando hemorragias.

Modo de Usar: 2g por Kg de ração a 2g por 5Kg de ração.

K

Indicações: Anti-hemorrágico e diminuidor do tempo de coagulação do sangue. Como acelerador da protrombina do sangue. Utilizada nas fases pré ou pós cirúrgicas.

Aves: aumenta a resistência a hemorragias e diminui o tempo de cicatrização.

Modo de Usar: 1g por Kg de ração a 3g por 10Kg de ração.